

PlakACT™

med Klorhexidin



Store bakterieaflejringer skaber et usundt miljø i munden, der har en negativ indvirkning på slimhinderne. Dette bør ikke ignoreres. Det er vigtigt at reagere hurtigt og opretholde en sund mundhygiejne for at forhindre en eskalering af symptomerne.

Din allierede i sund mundhygiejne

PlakACT-serien med klorhexidin er indiceret til at være en del af en normal hygiejnerutine og forhindrer bakterieaflejringer (plak) på tandoverfladen og slimhinderne, så de forbliver sunde.

- Fungerer som en mundskyl, mundspray eller gel præcis, hvor du har brug for det, og med den ønskede intensitet.
- Serien omfatter tre produkttyper, som kan anvendes i hjemmet og i tandlægepraktisser.

Stop opbygning af plak.

Hvad er plak?

Plak er en klæbrig film, der klæber sig fast til tænderne (tandoverflader, rekonstruktioner og tandreguleringsanordninger, herunder proteser og broer). Hvis opbygning af plak på tænderne efterlades uforstyrret og udvikler sig til tandsten, kan det være besværligt at fjerne.

Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe plak?

Plak er den underliggende årsag til mange tand- og mundsygdomme. Bakterierne i plak producerer syrer, der angriber tandemaljen, hvilket forårsager huller i tænderne og kan medføre tidligere stadier af en tandkødssygdom kaldet tandkødsbetændelse. Plak kan også føre til dårlig ånde og kan resultere i, at tænderne fremstår gule og usunde.

Grundprincipperne for en god mundhygiejne

- Oprethold en sund mundhygiejne: Børst tænder to gange om dagen, og brug tandtråd regelmæssigt til at fjerne plak og urenheder fra svært fremkommelige områder.
- Kombiner en sund hygiejnerutine med en ekstra plakkontrol
- Spis varieret, og begræns antallet af mellemmåltider.
- Gå til tandlægen mindst én gang om året for at få udført professionel tandrensning og få foretaget et tandeftersyn.

Fakta om Klorhexidin

Klorhexidin har været kommercielt tilgængeligt i næsten 60 år. PlakACT-serien indeholder klorhexidin-digluconat, der er et af de tilsvarende salte af klorhexidin, som finder bred anvendelse i tandplejeindustrien.

Dokumenterede formuleringsmuligheder tilgængelige på det skandinaviske marked

PlakACT Gel

0,2 % Klorhexidin

EGENSKABER

Gelformulering

- 0,2 % Klorhexidin-digluconat
- Applikatortud
- Uden alkohol



PlakACT Mundskyl

0,1 % Klorhexidin

EGENSKABER

Væskeformulering

- 0,1 % Klorhexidin-digluconat
- Uden farvestoffer
- Klar til brug
- Med doseringshætte



PlakACT Spray

0,1 % Klorhexidin

EGENSKABER

Spray - Med den samme væskeformulering som PlakACT Mundskyl

- 0,1 % Klorhexidin-digluconat
- Uden farvestoffer
- Uden drivmidler
- Dispensertud
- Prædoseret mængde



uleringer, som har været hweiziske marked i 40 år

Kerr™

ANVENDELSE/FORDELE

Når du ønsker en længerevarende effekt

- Til intensiv plakforebyggende behandling, herunder især:
 - Før og efter alle tandbehandlinger inklusive parodontalkirurgi.
 - I tilfælde af problemer med periodontalt og gingivalt væv.
 - Til daglig hygiejne for brugere af løse tandproteser og tandreguleringsanordninger, som kan medføre øget opbygning af plak og irritation af tandkødet. Dette kan også hjælpe med at bekæmpe ubehagelig lugt, der sommetider kan forårsages af selve anordningerne.
- Måltrettet behandling af det berørte område uden dispensering af gel.
- Bliver på plads/skylles ikke væk.
- Efterlader munden behageligt frisk.

SÅDAN ANVENDES PRODUKTET*



Påfør PlakACT Gel direkte på det berørte område med applikator-tuden.



Efterlad gelen i ca. 1 minut, og massér det langsomt på med en finger.



På løse proteser eller tandreguleringsanordninger: Påfør et lag PlakACT Gel på de dele af tandproteser eller tandreguleringsanordninger, der er i kontakt med slimhinderne og tænderne.

ANVENDELSE/FORDELE

Til normal hygiejnerutine

- Når kontrol af plakdannelse er vanskeligt eller ikke muligt (f.eks. kirurgiske behandlinger, tandudtrækninger, implantater, fastmonterede proteser, tandreguleringsanordninger og patienter med fysiske eller psykiske men).
- Fremragende supplement til behandling af halitosis af dental oprindelse og til at beskytte slimhinderne i mundhulen.
- Skal ikke fortyndes.
- Nem dispensering.

SÅDAN ANVENDES PRODUKTET*




Skyl med 10 ml ufortyndet mundskyl i 15 sekunder.

ANVENDELSE/FORDELE

Til målrettet påføring

- Når behandlingen ikke omfatter hele mundhulen.
- Når kontrol af plakdannelse er vanskeligt eller ikke muligt (i lighed med mundskyl).
- Fremragende supplement til behandling af halitosis (i lighed med mundskyl).
- Nemt og præcist at anvende: Tillader målrettet påføring på det berørte område og i en prædoseret mængde.



Spray den prædoserede mængde på det berørte område.

* Se den komplette brugsanvisning for flere oplysninger. Undlad at skylle munden med vand umiddelbart efter brug af PlakACT. Det anbefales at anvende PlakACT 2-3 gange om dagen. PlakACT-produkter er ikke anbefalet til brug i mere end 2 uger i træk.

PlakACT™

med Klorhexidin



PlakACT til brug i hjemmet og i tandlægepraktisser



I hjemmet

- Som generelt supplement til en normal hygiejnerutine
- Som opfølgning på en professionel tandrensning
- Efter f.eks. kirurgisk behandling/tandudtrækning
- I tilfælde af halitosis af dental oprindelse
- Til daglig behandling af løse tandproteser eller tandreguleringsanordninger.



I tandlægepraktisser

- Før og efter alle tandbehandlinger inklusive parodontalkirurgi.

Bestillingsoplysninger

PlakACT™ med Klorhexidin

Ref. varenr.	Beskrivelse
8550	PlakACT™ Gel - Beskyttelsesgel til tandkød - 0,2 % Klorhexidin - 33 g
8551	PlakACT™ Gel - Beskyttelsesgel til tandkød - 0,2 % Klorhexidin - 20 x 5 g
8553	PlakACT™ Mundskyl - 0,1% Klorhexidin - 250 ml
8560	PlakACT™ Spray - 0,1% Klorhexidin - 50 ml